

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ANTIBIOTIKΩΝ

αμπικιλίνη και δικλοξακιλλίνη

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΣΩ

ΟΔΩΝ



διεύρυνση του φάσματος δράσης

Η δικλοξακιλλίνη είναι δραστική έναντι των Gram+ μικροοργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των σταφυλόκοκκων που παράγουν πενικιλινάσες. Σε αντίθεση με την αμπικιλίνη, το εύρος δράσης περιλαμβάνει τα Gram- βακτήρια, και ειδικότερα τα *Escherichia coli*, *Salmonella* spp. και *Pasteurella* spp.



ενίσχυση της δράσης του αντιβιοτικού

Η δικλοξακιλλίνη είναι ανθεκτική σε όλες τις πενικιλινάσες, με τις οποίες παρουσιάζει πολύ μεγάλη ικανότητα πρόσδεσης, αφήνοντας άθικτη την αμπικιλίνη. Απομακρύνει έτσι τα ένζυμα αυτά από την αμπικιλίνη, καθιστώντας την "ελεύθερη" να δράσει έναντι όλων των ευαίσθητων σε αυτήν βακτηρίων.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

CLOXALENE® PLUS ενδομαστική αλοιφή κατάλληλη για θεραπεία

οξείας, υποξείας και χρόνιας μαστίτιδας

που προκαλείται από μικροοργανισμούς ευαίσθητους στην συνδυαστική δράση αμπικιλίνης και δικλοξακιλλίνης

CLOXALENE® PLUS

ΕΝΔΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ

σταφυλόκοκκοι (*S. aureus*, περιλαμβανομένων των ανθεκτικών στην πενικιλίνη, *Staph. epidermidis*)

στρεπτόκοκκοι (*Str. agalactiae*, *Str. dysgalactiae*, *Str. uberis*, *Str. zooepidemicus*)

ακτινομύκητες (*A. pyogenes*)

κολιβάκιλλοι (*E. coli*)

εντεροβακτήρια (*E. faecalis*)



ΟΦΕΛΗ

- **μειωμένη ανθεκτικότητα**
- **χρόνος αναμονής για το κρέας και το γάλα 5 ημέρες**

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ενδομαστική αλοιφή/ τεταρτημόριο + σύριγγα 12 ώρες μετά την πρώτη εφαρμογή
Χορηγείται σε δύο διαδοχικές αμέλειες

