

ERY SUIVAX[®]

Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά
της ερυθράς του χοίρου



FATRO HELLAS S.P.A.

ERY-SUIVAX®



Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά
της ερυθράς του χοίρου

Η ΝΟΣΟΣ

Η ερυθρά είναι μεταδοτική και ενζωτική νόσος του χοίρου. Αιτιολογικός παράγοντας είναι το βακτήριο, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, που προκαλεί οξεία και υποξεία σηψαιμική νόσο στον χοίρο (με χαρακτηριστικές δερματικές αλλοιώσεις) και μπορεί να εξελιχθεί σε χρόνια μορφή και να προκαλέσει ενδοκαρδίτιδα ή αρθρίτιδα. Η μόλυνση γίνεται απαραίτητα μέσω λύσεων της συνέχειας του δέρματος, καθώς το βακτήριο είναι πολύ κοινό στην φύση.

ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ

Το ERY-SUIVAX είναι αδρανοποιημένο εμβόλιο προσροφημένο σε υδροξείδιο του αργιλίου αποτελούμενο από υψηλής αντιγονικής ικανότητας στελέχη *Erysipelothrix rhusiopathiae*. Το εμβόλιο είναι σε θέση να εγκαταστήσει μια ισχυρή ενεργητική ανοσία που προλαμβάνει τόσο την εκδήλωση οξέων λοιμώξεων που επιφέρουν απότομους θανάτους, όσο και τις χρόνιες λοιμώξεις που συνοδεύονται από μείωση των αποδόσεων των παχυνόμενων χοίρων ή επιδρούν στην παραγωγική ικανότητα των ζώων αναπαραγωγής.

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ

Το ERY-SUIVAX είναι προσροφημένο σε υδροξείδιο του αργιλίου, ένα ιδανικό ανοσοενισχυτικό για την πρόκληση των ανοσοδιεγερτικών ιδιοτήτων του *Erysipelothrix rhusiopathiae*, καθώς προκαλεί μια αργή απελευθέρωση των διαλυμένων αντιγόνων. Επίσης, το υδροξείδιο του αργιλίου εγγυάται την απουσία εμφάνισης τοπικών αντιδράσεων στο σημείο έγχυσης.

ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Υποδόρια, πίσω από το αυτί.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

1 δόση = 2 ml.

ΕΜΒΟΛΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παχυνόμενοι χοίροι:
στην ηλικία των 3 μηνών.

Χοίροι αναπαραγωγής:
αρχικά στην ηλικία των 3 μηνών και επαναλαμβάνεται κάθε 6 μήνες.

Αναμνηστικοί εμβολιασμοί κάθε 6 μήνες σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις κάθε 8 έως 12 μήνες.



FATRO HELLAS S.P.A.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

FATRO HELLAS Μ.ΕΠΕ - 2ο χιλ/τρο ΠΑΙΑΝΙΑΣ-ΣΠΑΤΩΝ, 190 02, ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ: + 30 210 6644331 - FAX: +30 2106644334 - E-mail: fatro@fatro-hellas.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (S.P.C.) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ERY-SUIVAX. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικά συστατικά: Σύνθεση ανά 1 ml Δραστικά συστατικά: Αδρανοποιημένα αντιγόνα (μόνο βακτηριακά κύτταρα-βακτηρίνη) δύο στελεχών F0026 & F0035 του *Erysipelothrix rhusiopathiae* όχι λιγότερο από 100 Ρ.Υ. Έκδοχα: Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Βακτηριοκτόνο εναώρημα. 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1 Είδη ζώων Χοίροι. 4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζονται τα είδη ζώων Για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοίρων κατά της προσβολής από *E. rhusiopathiae*, αιτιολογικού παράγοντα της ερυθράς. 4.3 Αντενδείξεις Δεν υπάρχουν. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου Να μην εμβολιάζονται χοίροι ηλικίας μικρότερης των 2 μηνών. Χορηγείται μόνο σε υγιή και σε μη ευρισκόμενα υπό την επίδραση stress, ζώα. 4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρήση Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρήση σε ζώα Ανακινήσατε καλά το φιαλίδιο πριν τη χρήση. Συνιστάται, μετά το άνοιγμα, η χρησιμοποίηση ολόκληρου του περιεχομένου του φιαλιδίου. Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα Δεν συνιστώνται. 4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συνήθιστα και σοβαρότητα) Δεν υπάρχουν. 4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωστοκία Δεν αναφέρονται. 4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Δεν αναφέρονται. 4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 1 δόση = 2ml το εμβόλιο. Ενίεται υποδόρια κατά προτίμηση πίσω από το αυτί. Παχυνόμενοι χοίροι: Ο εμβολιασμός γίνεται στην ηλικία των 3 μηνών. Χοίροι αναπαραγωγής: Ο αρχικός εμβολιασμός διενεργείται στην ηλικία των 3 μηνών και επαναλαμβάνεται κάθε 6 μήνες. Αναμνηστικοί εμβολιασμοί κάθε 6 μήνες σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις κάθε 8 έως 12 μήνες. 4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα Δεν υπάρχουν πληροφορίες. 4.11 Χρόνος(οι) αναμονής Δεν υπάρχει (0) ημέρες. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Ανοσολογικά σκευάσματα για ζώα της οικογένειας Suidae, Χοίροι, εμβόλιο αδρανοποιημένων βακτηρίων (συμπεριλαμβανομένων μυκοπλασμάτων, τοξοειδών, χλαμυδίων), Ερσιπέλας. Κωδικός ATCvet: Q109AB03. 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες Το ERY-SUIVAX είναι νεκρό εμβόλιο προσροφημένο σε υδροξείδιο του αργιλίου αποτελούμενο από υψηλής αντιγονικής ικανότητας στελέχη *Erysipelothrix rhusiopathiae*. Το εμβόλιο είναι σε θέση να εγκαταστήσει μια ισχυρή ενεργητική ανοσία που προλαμβάνει τόσο την εκδήλωση οξέων λοιμώξεων που επιφέρουν απότομους θανάτους, όσο και τις χρόνιες λοιμώξεις που συνοδεύονται από μείωση των αποδόσεων των παχυνόμενων χοίρων ή επιδρούν στην παραγωγική ικανότητα των ζώων αναπαραγωγής. 5.2 Φαρμακοκινητικά στοιχεία Δεν αναφέρονται. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Aluminium hydroxide 20 mg - Thiomersal 0,1 mg - Isotonic saline solution q.s. 1 ml. 6.2 Ασυμβατότητες Δεν αναφέρονται. 6.3 Διάρκεια ζωής 24 μήνες. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Το εμβόλιο διατηρείται στο ψυγείο, σε θερμοκρασία +2° C έως +6° C. 6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας Υάλινες φιάλες type I flint glass, με ελαστομερές πώμα σφραγισμένο με δακτύλιο αλουμινίου των 20 και 100 ml. 6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν Να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος από το περιεχόμενο, τους περιέκτες και τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ FATRO S.p.A. - Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna), Italy. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 28889/K-2532/3.02.1993. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: _____. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ _____. 11. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΗΣ Δεν ισχύει. 12. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή.



Φιάλη 100 ml (50 δόσεις)