

Farmatan® liquid

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το Farmatan® liquid θα πρέπει πάντα να διαλύεται στο πόσιμο νερό πριν από την χρήση του.

1. Θα έπρεπε να χρησιμοποιείται μόνο πλαστική δεξαμενή ή κάτι ανάλογο για την διάλυση του Farmatan® στο νερό. Το διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πλαστικά ή ανοξείδωτα συστήματα παροχής νερού.
2. Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση.
3. Να ετοιμάζετε νέο διάλυμα Farmatan® liquid κάθε μέρα, λίγες ώρες πριν από την χρήση. Να απορρίπτετε τα υπολείμματα.
4. Μην συνδυάζετε το Farmatan® Liquid με άλλες αγωγές.
5. Το Farmatan® liquid θα πρέπει να χορηγείται με τη βοήθεια δοσομετρικής αντλίας όταν χρησιμοποιείται στα συστήματα παροχής νερού στα πτηνοτροφεία. Παρακαλώ ακολουθήστε τις λεπτομερείς οδηγίες παρακάτω.

Συνιστώμενη δοσολογία:

Broilers: 1-2 ml/L πόσιμο νερού, 5 – 7 ημέρες

Μοσχάρια: 3-7 ml/L πόσιμο νερού, 5 – 7 ημέρες

Χρήση του Farmatan® liquid σε συστήματα παροχής νερού των πτηνοτροφείων

1. Το Farmatan® liquid θα έπρεπε να χρησιμοποιείται με την χρήση δοσομετρικής αντλίας. Μην τοποθετείτε το Farmatan® liquid σε δεξαμενή που βρίσκεται σε ύψος για να αποφεύγεται η ανάπτυξη βιομεμβρανών στο σύστημα ύδρευσης.
2. Όλο το σύστημα διανομής νερού πρέπει να καθαρίζεται σωστά, συμπεριλαμβανομένων και των αποθεμάτων, για να αφαιρεθούν υπολείμματα βιταμινών, αντιβιοτικών και άλλων δραστικών ουσιών. Επίσης, πρέπει να καθαρίζεται και η δοσομετρική αντλία. Καθώς μικρά κατάλοιπα μπορεί να συσσωρευτούν στον πάτο της δεξαμενής που χρησιμοποιείται, να απορρίπτετε τα τελευταία ml του έτοιμου διαλύματος.
3. Το διάλυμα δεν θα πρέπει να παραμένει για περισσότερες από 8 ώρες ανά ημέρα στο σύστημα παροχής νερού. Ετοιμάζετε μόνο την ποσότητα διαλύματος που θα χρησιμοποιήσετε. Ξεπλύνετε το σύστημα με καθαρό νερό βρύσης για τις επόμενες 16 ώρες μετά την χρήση για να εξαλείψετε κάθε κατάλοιπο του Farmatan® liquid από τους σωλήνες και να αποφευχθεί πιθανός σχηματισμός βιομεμβρανών και πηγμάτων.
4. Να μην συνδυάζετε το Farmatan® liquid με άλλες αγωγές μέσω του πόσιμου νερού. Να μην συνδυάζετε το Farmatan® liquid με H₂O₂.

5. Συνιστώμενη δοσολογία:

1 L / 1000 L πόσιμο νερού, 8 ώρες ανά ημέρα*, 5 ημέρες

Σε καταστάσεις stress:

2-4/ 1000 L πόσιμο νερού, 8 ώρες ανά ημέρα*, μέχρι 3 ημέρες

*Ξεπλύνετε το σύστημα με καθαρό πόσιμο νερό για 16 ώρες μετά από κάθε χρήση.

