



Farmatan[®]liquid

Ανάλυση του προϊόντος

ένα φυσικό υγρό συμπλήρωμα διατροφής



Ταννίνες από γλυκοκάστανα



Χτίστε ένα υγιές σπίτι για τα ζώα σας

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ

Πρόληψη κατά του οξειδωτικού stress

ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΟ

Αυξημένη ξηρή ουσία στα περιττώματα


Τρόπος δράσης

ΕΝΤΟΝΗ ΓΕΥΣΗ

Βελτιωμένη ελκυστικότητα της τροφής

Βελτιώνει την παραγωγικότητα και τις αποδόσεις

Αναστολή ανάπτυξης *Salmonella typhimurium* και *E. coli*



Πρόγραμμα:

- In vitro test για:
 - *E. coli* → Drigalsky άγαρ.
 - *Salmonella* → Rambach άγαρ.
- Τα αποτελέσματα καταγράφηκαν ύστερα από 20 - 24 ώρες αναερόβιας επώασης στους 37°C.

Η ελάχιστη συγκέντρωση Ταννινών από γλυκοκάστανα έχει ανασταλτική επίδραση σε όλα τα *E.coli* και *Salmonella*


(Πηγή: PhD. Bole, Veterinarian Faculty Ljubljana, Biotechnical faculty, Slovenia, 2005)



Ταννίνες από γλυκοκάστανα




Επίδραση του Farmatan σε ενοφθαλμισμό με *Cl. perfringens* τύπος C (PSA 2011)



Συγκεντρώσεις ταννινών 0.0125% ή υψηλότερες είχαν βακτηριοκτόνο δράση.

Λιγότερες αλλοιώσεις στις μολύνσεις από Eimeria



Δοκιμή:

3 ομάδες με 19 πτηνά από κάθε μονάδα

- T01: μη μολυσμένα
- T02: μόνο μολυσμένα
- T03: μολυσμένα και θεραπευμένα

Τα πτηνά μολύνθηκαν την Ημέρα 6. Καταγραφή των αλλοιώσεων έγινε την Ημέρα 21.

Αποτελέσματα

Το υπό δοκιμή προϊόν προκάλεσε μεταβολή στην μικροχλωρίδα και τις ζυμώσεις στα τμήματα των τυφλών σε σχέση με αυτές που παρατηρούνται στα μη μολυσμένα (control).

Farmatan[®] liquid



- Ενισχύει την συνολική υγεία των ζώων
- Υποστηρίζει την καλή ανάπτυξη του εντέρου στα νεαρά ζώα
- Σταθεροποιεί τα ζώα σε συνθήκες stress
- Προάγει την ανάπτυξη της ωφέλιμης μικροχλωρίδας
- Προστατεύει τον βλεννογόνο του εντέρου
- Μειώνει την συχνότητα εμφάνισης διάρροιας
- Βελτιώνει την σύσταση των κοπράνων
- Μειώνει την θνησιμότητα
- Προάγει την ανάπτυξη των εντερικών λαχνών
- Βελτιώνει την παραγωγικότητα



Farmatan[®] Liquid



Επίδραση του Farmatan[®] Liquid στην διατροφή των Broilers

Πανεπιστήμιο Maribor, Slovenia, April 2013

Τα πρώτα αποτελέσματα σε broilers στην ηλικία 7 ημερών



Farmatan® liquid



Η περιοδική χορήγηση του Farmatan® liquid βελτιώνει τις αποδόσεις των broilers

Εμπορική εκτροφή, Σερβία, 2015

Δοκιμή: Χορηγήθηκε Farmatan® liquid στο νερό για τις πρώτες 5 εβδομάδες περιοδικά → 3 ημέρες ανά εβδομάδα.

Ομάδες: Δύο επαναλήψεις. 19.000 broilers στην κάθε ομάδα. Η μία ομάδα ήταν control (T_Ctrl) και η άλλη υπό δοκιμή (T_F.liq) και τις 2 φορές. Όλες οι ομάδες ταΐστηκαν με κανονική εμπορική τροφή. 1 ml/L Farmatan® liquid για 8 ώρες/ημέρα προστέθηκε στις υπό δοκιμή ομάδες για 3 ημέρες ανά εβδομάδα.

Τελικά αποτελέσματα την εβδομάδα 6:

Ομάδες	T_Ctrl	T_F.liq	T_Ctrl1	T_F.liq1
Αριθμός ορνίθων	19210	19200	18176	18178
Αρχικό βάρος (g)	44	44	43	43
Τελικό βάρος, εβδ. 6 (g)	2338	2395	2390	2480
Αθροιστική θνησιμότητα (%)	4,00	3,18	3,84	2,60
Βάρος σφαγής (kg)	43117	44521	41772	43908
Συνολική κατανάλωση τροφής (kg)	76748	77860	73519	75961
Δείκτης μετατρεψιμότητας τροφής	1,777	1,749	1,760	1,730
Return on investment (ROI)	1: 4,6		1: 5,5	

