

MICOSPECTONE

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΛΙΝΚΟΜΥΚΙΝΗΣ + ΣΠΕΚΤΙΝΟΜΥΚΙΝΗΣ

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ



Αυξημένη αποτελεσματικότητα στην πρόληψη και την θεραπεία των κύριων λοιμωδών νοσημάτων που οφείλονται σε βακτήρια ή / και μυκοπλάσματα

Εύκολη χορήγηση στο πόσιμο νερό

Δοσομετρητής με βαθμονομημένη κλίμακα για τον σωστό προσδιορισμό της δόσης



FATRO HELLAS S.P.A.

MICOSPECTONE

ΤΟ MICOSPECTONE POLVERE ΓΙΑ ΤΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ	Ενζωτική πνευμονία από <i>Mycoplasma hyorhynchiae</i> Πλευροπνευμονία από <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i>
ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ ΤΩΝ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟ	Κολιβακίλλωση Σαλμονέλλωση
ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ	Πολυαρθρίτιδα/Πολυορογονίτιδα των χοιριδίων

ΤΟ MICOSPECTONE POLVERE ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΝΙΘΙΑ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΩΣΗ	Χ.Α.Ν. από <i>Mycoplasma gallisepticum</i> Υμενίτιδα από <i>Mycoplasma synoviae</i> Λοίμωξη από <i>Mycoplasma meleagridis</i>
ΚΟΛΙΒΑΚΙΛΛΩΣΗ	
ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΣΗ	Λευκή διάρροια νεοσσών και ενηλίκων πτηνών Τύφος Αριζώνωση Γενικότερα, σαλμονελλώσεις
ΧΟΛΕΡΑ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ	
ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΚΟΡΥΖΑ ΑΠΟ <i>HAEMOPHILUS</i> SPP.	
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ <i>STARHYLOCOCCCUS</i> ΚΑΙ <i>STREPTOCOCCUS</i>	

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΕΑΣ

χοιρίδια: 14 ημέρες
ορνίθια κρεοπαραγωγής: 7 ημέρες

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΟΙΡΙΔΙΑ	0,3 g/10 kg σ.β.	20 g/ 100 λίτρα πόσιμου νερού
ΟΡΝΙΘΙΑ ΜΕΧΡΙ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ	3 g/10 kg σ.β. για 3 ημέρες	300 g/100 λίτρα πόσιμου νερού
ΟΡΝΙΘΙΑ ΑΝΩ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ	1 g/10 kg σ.β. για 3 ημέρες	100 g/100 λίτρα πόσιμου νερού

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μην χορηγείται σε
ωτόκες όρνιθες και σε
κυοφορούσες χοιρομητέρες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Βάζα των 250 g

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (S.P.C.): 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: MICOSPECTONE ORAL SOL. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Τα 100 g του προϊόντος περιέχουν: Δραστικά συστατικά: Lincosylin hydrochloride (ισοδύναμη προς Lincosylin 16,650 g) 18,900 g - Spectinomycin hydrochloride (ισοδύναμη προς Spectinomycin 33,350 g) 49,710 g. Έκδοχα: Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Υδατοδιαλυτή σκόνη. 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4.1 Είδη ζώων: χοιρίδια, ορνίθια κρεοπαραγωγής. 4.2 Φαρμακευτικές ενδείξεις: προφύλαξη, από εϊδη ζώων, χοιρίδια: Το MICOSPECTONE ORAL SOL ενδείκνυται για τη θεραπεία της βακτηριακής και της μυκοπλασματικής πνευμονίας της δυσπνευστίας των χοιρίων (T. hyorhynchiae), της βακτηριακής εντερίτιδας και της λοιμώδους αρθρίτιδας. ΟΡΝΙΘΙΑ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Το MICOSPECTONE ORAL SOL για την πρόληψη και θεραπεία της Χ.Α.Ν. 4.3 Αντενδείξεις: Ιστορικό ευαισθησίας σε ένα από τα δύο αντιβιοτικά ή στο συνδυασμό. Να μη χορηγείται σε ωτόκες όρνιθες. Να μη χορηγείται σε κυοφορούσες χοιρομητέρες. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου: Καμία. 4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρήση: Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρήση σε ζώα Καμία. Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα Καμία. 4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα): Αντιβιοτικές υπεραισθησίες, γαστρεντερικές διαταραχές (έμετος, διάρροια). 4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ασοκία: Να μη χορηγείται κατά την διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας. 4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: - Κατά από ορισμένες προϋποθέσεις η λινκομυκίνη είναι ασύμβατη με την αμπικιλίνη, τη βενζιλική πενικιλίνη, την κολιστίνη, την κανοναμίνη και την ερυθρομυκίνη. - Η σπεκτινομυκίνη μπορεί να αντιδράσει με το λίθιο. 4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Χορηγείται διαλυμένο στο νερό. Ορνίθια κρεοπαραγωγής: - ηλικία μέχρι 3 εβδομάδων: 3 g/10 kg σ.β. για 3 ημέρες - μετά την 3η εβδομάδα: 1 g/10 kg σ.β. για 3 ημέρες. Χοιρίδια: 0,3 g/10 kg σ.β. 4.10 Πρωτοβουλίες (συμμόρφωση, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα: Δεν είναι γνωστά ειδικά αντίδοτα σε περίπτωση υπερδοσολογίας. 4.11 Χρόνος(οι) αναμονής κρέας: (χοιρίδια): 14 ημέρες. Κρέας: (ορνίθια κρεοπαραγωγής): 7 ημέρες. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Φαρμακοκινητική ομάδα: Αντιβακτηριακά για συστηματική χορήγηση, Μακρολίδια, Λινκοσαμίδες και στρεπτογρμμάνες, Λινκοσαμίδες. Κυκλικός ATCvet: J01FF52. 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες: Το MICOSPECTONE είναι συνδυασμός λινκομυκίνης (αντιβιοτικό της ομάδας λινκοσαμίδης) και σπεκτινομυκίνης (μία αμινοκυκλολίνη). Και οι δύο δραστικές ουσίες εμποδίζουν την πρωτεϊνική σύνθεση, η λινκομυκίνη μέσω του δεσμού με την ριβοσωμική υπομονάδα 50S και η σπεκτινομυκίνη με την ριβοσωμική υπομονάδα 30S. Για ότι αφορά την φαρμακολογική δράση, το φάρμακο δράσει της λινκομυκίνης περιλαμβάνει κυρίως βκτηκός κατά Gram μικροοργανισμούς και Μικοπλάσμα. Το φάσμα της σπεκτινομυκίνης είναι ευρύτερο από εκείνο της λινκομυκίνης και περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των κατά Gram αρνητικών μικροοργανισμών όπως επίσης μερικούς κατά Gram θετικούς. Ο συνδυασμός αυτών των δύο δραστικών ουσιών, χαρακτηρίζεται από έντονη συνεργική δράση κατά πολλών παθογόνων βακτηρίων, συμπεριλαμβανομένων Μικοπλάσματος. 5.2 Φαρμακοκινητικά στοιχεία: ... 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 6.1 Κατάλογος εκδόχων: Lactose qs. 100 g. 6.2 Ασυμβατότητες: Καμία. 6.3 Διάρκεια ζωής: 4 έτη. Το παρασκευασμένο διάλυμα, με την υδατοδιαλυτή σκόνη στο πόσιμο νερό, παραμένει σταθερό για 24 ώρες, σε θερμοκρασία δωματίου και προστατευμένο από το φως. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος: Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, προστατευμένο από το φως. 6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας: Φακίλλοι σε στρώματα πολυεστέρα, αλουμινίου, πολυεθυλενίου κλεισμένοι δια θερμοσυγκολλητήρας. 10 g. Βάση από πολυπροπυλένιο σφραγισμένα με δικτύωλο αλουμινίου και κλεισμένα με πλάμα ασφαλείας 250 g και 3 kg. 6.6 Ειδικές προφυλάξεις σφράγισης ενός χρησιμοποιούμενου κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν: Να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος από το περιεχόμενο, τους περιέκτες και τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ FATRO S.p.A. - Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna), Italy. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 25875/7-5-2004. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΡΗΣΗΣ/ΑΝΑΒΕΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: ... 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: ... 11. ΑΠΑΓΟΡΕΥΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΗΣ: Δεν ισχύει. 12. ΧΟΡΗΓΗΣΗ: Χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή.



FATRO HELLAS S.P.LTD

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

FATRO HELLAS Μ.ΕΠΕ - 2ο χιλ/τρο ΠΑΙΑΝΙΑΣ-ΣΠΑΤΩΝ, 190 02, ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ: + 30 210 6644331 - FAX: + 30 2106644334 - E-mail: fatro@fatro-hellas.gr