

# Naxolot

**Αποτελεσματικό  
και ασφαλές  
ανθελμινθικό για  
μηρυκαστικά**

Τα μηρυκαστικά συχνά μολύνονται κατά την βόσκηση με αυγά και προνύμφες παρασίτων. Το αποτελεσματικό αντιπαρασιτικό σκεύασμα NAXOLOT είναι ακριβώς ό,τι χρειάζονται τα ζώα αυτά, καθώς προστατεύει τα ζωτικά όργανα, όπως το ήπαρ, οι πνεύμονες και το έντερο.

Το NAXOLOT είναι έτοιμο για χρήση κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν με βάση την λεβαμιζόλη και οξυκλοζανίδη, σε υδατικό εναιώρημα (ιδανικό για πόσιμη θεραπεία).



Η ορθή ποσότητα των ενεργών συστατικών από την πρώτη ως την τελευταία σταγόνα διασφαλίζεται από:

- ομοιογενές, σταθερό ιξώδες (200-500 mP/s)
- δεν διαχωρίζεται σε φάσεις
- δεν σχηματίζει ίζημα

**Ετήσια αγωγή: μία  
εφάπαξ αγωγή για  
απαλλαγή από τα  
ευαίσθητα παράσιτα**

Τα 100 ml του NAXOLOT περιέχουν:  
υδροχλωρική λεβαμιζόλη 1,5 g και  
οξυκλοζανίδη 3 g.



FATRO HELLAS S.P.A.

# ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η **λεβαμιζόλη** θανατώνει τα παράσιτα μέσω της εκπόλωσης των κυττάρων των μυϊκών ινών.

Η **οξυκλοζανιδή** παρεμβαίνει στον μηχανισμό ενέργειας που σχετίζεται με την κινητικότητα των ελμίνθων και προκαλεί μη αναστρέψιμη παράλυση των παρασίτων.

## Ενδείξεις

• **Μόλυνση γαστρεντερικής και αναπνευστικής οδού από νηματώδη**

• **Φασιόλωση χοληδόχου πόρου**

• **Εντερική ταινίαση**

## Αποτελεσματικότητα

Ποσοστά δραστηριότητας (%) του προϊόντος ενάντια σε ευαίσθητους έλμινθες αναφέρονται παρακάτω:

Όργανο στόχος (Ταξινόμηση παρασίτων)	Έλμινθες	Βοοειδή	Πρόβατα
<b>Ήνυστρο</b> (Νηματώδη ή σκώληκες)	<i>Haemonchus</i>	100%	100%
	<i>Ostertagia</i>	98%	98%
	<i>Trichostrongylus axei</i>	99%	99%
<b>Έντερο</b> (Νηματώδη ή σκώληκες)	<i>Trichostrongylus</i>	100%	99%
	<i>Nematodirus</i>	100%	100%
	<i>Cooperia</i>	99%	100%
	<i>Oesophagostomum</i>	100%	95%
	<i>Bunostomum</i>	100%	100%
	<i>Chabertia</i>	100%	100%
<b>Πνεύμονες</b> (Νηματώδη ή σκώληκες)	<i>Haemonchus</i>	99%	99%
<b>Ήπαρ</b> (Τρηματώδη ή αγκυλόστομα)	<i>Fasciola hepatica</i>	100%	100%
<b>Έντερο</b> (Κεστώδη ή ταινίες)	<i>Moniezia</i>	100%	100%

## Ασφάλεια

Το προϊόν αυτό αποτελείται από δύο ενεργά συστατικά. Η μέγιστη απορρόφηση των ενεργών συστατικών πραγματοποιείται σε εντελώς διαφορετικό χρόνο. Συνεπώς, επιβαρύνονται λιγότερο τα ζωτικά όργανα για τον μεταβολισμό τους (τα οποία ήδη βρίσκονται σε stress λόγω της παρουσίας των παρασίτων).

Ενεργό συστατικό	Μέγιστη τιμή στο αίμα	Οδός απέκκρισης	
<b>Λεβαμιζόλη</b>	2 ώρες	Ούρο	Κύρια οδός
		Κόπρανα	Κύρια οδός
		Γάλα	Σε μικρό βαθμό
<b>Οξυκλοζανιδή</b>	24 ώρες	Κόπρανα	Κύρια οδός
		Ούρο	Σε μικρό βαθμό
		Γάλα	Ελάχιστη

## Χρόνος αναμονής

**Κρέας:** 14 ημέρες

**Γάλα:** Δεν επιτρέπεται η χορήγηση NAXOLOT σε γαλακτοπαραγωγά ζώα των οποίων το γάλα προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, κατά τη διάρκεια της γαλακτοπαραγωγής, ακόμη και κατά την διάρκεια της ξηράς περιόδου.

## Πλεονεκτήματα

- Το NAXOLOT είναι δραστικό ενάντια σε ευαίσθητα ενήλικα παράσιτα και τις προνύμφες τους
- Η αποτελεσματικότητα δεν εξαρτάται από το όργανο προσβολής (προστόμαχοι, έντερο, πνεύμονες, ήπαρ)
- Τα μηρυκαστικά μπορούν να αποδώσουν στον μέγιστο βαθμό, αφού προλαμβάνονται και οι χρόνιες και υποκλινικές παρασιτώσεις (τα ζώα μπορεί να μολύνονται χωρίς να εκδηλώνουν συμπτώματα)
- Εύκολη χορήγηση, καλώς ανεκτό από το ζώο, απλός υπολογισμός της δόσης
- Σύντομος χρόνος αναμονής για το γάλα
- Δεν απαιτείται κάποιο διατροφικό πρόγραμμα πριν την αγωγή



## Οδηγίες χρήσης και δοσολογία

Χορηγείται δια του στόματος στην ακόλουθη δοσολογία: 1ml/2kg σ.β. (ισοδυναμεί με 7.5mg λεβαμιζόλη/kg σ.β. και 15 mg οξυκλοζανιδή/kg σ.β.).

Βοοειδή		Πρόβατα, Αίγες	
Σωματικό βάρος (kg)	Δόση (ml)	Σωματικό βάρος (kg)	Δόση (ml)
50	25	έως 15	7,5
100	50	15-25	12,5
150	75	25-35	17,5
200	100	35-45	22,5
250	125	45	25
≥ 300	150 μέγιστη δοσολογία	> 45	25 μέγιστη δοσολογία

## Προειδοποιήσεις

- Να μην χορηγείται κατά το τελευταίο στάδιο της εγκυμοσύνης
- Να μην χορηγείται από την υποδόρια οδό. Τα ζώα υπό αγωγή να είναι σταβλισμένα..
- Σε μερικά ζώα, μπορεί να παρατηρηθεί διάρροια για 24-36 ώρες. Αυτό δεν έχει καμία επίδραση στην θεραπευτική αποτελεσματικότητα του προϊόντος.



FATRO HELLAS S.P.LTD

## ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

FATRO HELLAS Μ.ΕΠΕ - 2ο χιλ/τρο ΠΑΙΑΝΙΑΣ-ΣΠΑΤΩΝ, 190 02, ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΤΗΛ: + 30 210 6644331 - FAX: +30 2106644334 - E-mail: fatro@fatro-hellas.gr