

PLEURO SUIVAX[®]

Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της
πλευροπνευμονίας του χοίρου



FATRO HELLAS S.P.A.

PLEURO-SUIVAX®



Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της
πλευροπνευμονίας του χοίρου

Η ΝΟΣΟΣ

Η πλευροπνευμονία του χοίρου είναι μια νόσος ευρύτατα διαδεδομένη σε κάθε εντατική εκτροφή χοίρων. Προκαλείται από το Gram - βακτήριο *Actinobacillus pleuropneumoniae*, και εκδηλώνεται με διάφορες μορφές: υπεροξεία, οξεία και χρόνια, προκαλώντας σοβαρές οικονομικές απώλειες, θνησιμότητα στα παχυνόμενα, καθυστέρηση στην ανάπτυξη, μειωμένες αποδόσεις σε κρέας. Η μετάδοση της νόσου είναι άμεση, από μολυσμένους χοίρους σε υγιείς, μέσω αεροσταγονιδίων. Η προφύλαξη βασίζεται στην εφαρμογή σωστού εμβολιακού προγράμματος και εφαρμογή κανόνων υγιεινής στην εκτροφή.

ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ

Το PLEURO-SUIVAX είναι αδρανοποιημένο εμβόλιο, προσροφημένο σε υδροξείδιο του αργιλίου, κατά της πλευροπνευμονίας του χοίρου που οφείλεται στον *Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae*. Η σωστή χορήγηση του PLEURO-SUIVAX επιτρέπει την εγκατάσταση ισχυρής ανοσίας σε όλη την παραγωγική περίοδο των παχυνόμενων χοίρων. Ο περιοδικός εμβολιασμός των χοιρομητέρων στις μονάδες αναπαραγωγής-πάχυνσης εξασφαλίζει τη μετάδοση υψηλού βαθμού ανοσίας στα χοιρίδια, προστατεύοντάς τα από τις πρώτες ήδη εβδομάδες της ζωής τους.

ΤΟ ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ

Το PLEURO-SUIVAX προσροφάται σε υδροξείδιο του αργιλίου, ένα ανοσοενισχυτικό που ενδείκνυται ιδιαίτερα ως φορέας για βακτήρια. Το gel υδροξειδίου του αργιλίου, εγγυάται την απουσία τοπικών αντιδράσεων στο σημείο έγχυσης.

ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ενίεται υποδόρια, κατά προτίμηση πίσω από το αυτί.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Μία δόση = 2,5 ml.

ΕΜΒΟΛΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χοιρίδια:

Πρώτος εμβολιασμός: ηλικία 40-60 ημερών.

Δεύτερος εμβολιασμός: 3-4 εβδομάδες μετά τον πρώτο.

Χοιρομητέρες:

Πρώτος εμβολιασμός: 70η-80η ημέρα της κυοφορίας

Δεύτερος εμβολιασμός: 3 εβδομάδες μετά τον πρώτο.

Επανεμβολιασμοί: σε κάθε κυοφορία, μεταξύ 80ης - 100ης ημέρας της κύησης.

Ο εμβολιασμός των χοιρομητέρων συνιστάται μόνο εφόσον η νόσος εκδηλώνεται σε χοιρίδια ηλικίας μέχρι μίας εβδομάδας.

Κάπροι:

2 φορές τον χρόνο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (S.P.C.) 1. **ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ** PLEURO SUIVAX. 2. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ** Σύνθεση ανά 1 ml **Δραστικά συστατικά:** Αντιγόνα (μόνο βακτηριακά κύτταρα-βακτηρίνη) αδρανοποιημένα (νεκρά) των βισποτών 1 και 2 του *Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae* με τη προσθήκη ανοσοενισχυτικού - *Actinobacillus pleuropneumoniae* βιότοπος 1 15x10⁹ - *Actinobacillus pleuropneumoniae* βιότοπος 2 7x10⁹. **Έκδοχα:** Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1. 3. **ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΡΦΗ** Βακτηριοκτόνο εναιώρημα σε διάλυμα. Εμβόλιο. 4. **ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** 4.1 **Είδη ζώων** Χοίροι. 4.2 **Θεραπευτικές ενδείξεις προδιωρίζοντας τα είδη ζώων** Προφύλαξη των χοίρων από την πλευροπνευμονία που οφείλεται στον *Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae*. 4.3 **Αντενδείξεις** Ο εμβολιασμός αντενδείκνυται σε ζώα τα οποία εμφανίζουν συμπτώματα πλευροπνευμονίας καθώς και σε εκείνα τα οποία δεν βρίσκονται σε καλή υγιεινή κατάσταση. 4.4 **Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου** Εφόσον ανοιχτεί το φιαλίδιο, συνιστάται να χρησιμοποιείται αμέσως όλο το περιεχόμενο του. Απαιτείται προσεκτική απολύμανση του σημείου εγχύσεως του εμβολίου. Τα προς εμβολιασμό ζώα θα πρέπει να βρίσκονται σε καλή υγιεινή κατάσταση και σε καμία περίπτωση να μην εμφανίζουν συμπτώματα πλευροπνευμονίας. 4.5 **Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρήση** **Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρήση σε ζώα** Εφόσον ανοιχτεί το φιαλίδιο, συνιστάται να χρησιμοποιηθεί αμέσως όλο το περιεχόμενό του. Απαιτείται προσεκτική απολύμανση του σημείου εγχύσεως του εμβολίου. **Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα** Δεν κρίνονται απαραίτητες. 4.6 **Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα)** Δεν παρατηρούνται εφόσον ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης. 4.7 **Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την υστερία** Δεν υπάρχουν αντενδείξεις. 4.8 **Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης** Δεν αναφέρονται. 4.9 **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης** Δοσολογία: 2,5 ml. Ενίεται υποδόρια κατά προτίμηση πίσω από το αυτί. Ανακινάστε καλά το φιαλίδιο πριν τη χρήση. - **Χοιρίδια:** Ο εμβολιασμός διενεργείται σε όλα τα χοιρίδια στην ηλικία των 40-60 ημερών και επαναλαμβάνεται μετά από 3-4 εβδομάδες. Ανάλογα με την περίπτωση, η αναμνηστική δόση χορηγείται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την περίοδο που εκδηλώνεται συνήθως η νόσος στην εκτροφή. - **Χοιρομητέρες:** Ο πρώτος εμβολιασμός διενεργείται μεταξύ 70ης-80ης ημέρας της κυοφορίας και επαναλαμβάνεται 3 εβδομάδες αργότερα. Στη συνέχεια γίνεται ένας εμβολιασμός σε κάθε κυοφορία, μεταξύ 80ης - 100ης ημέρας της κύησης. Ο εμβολιασμός των χοιρομητέρων συνιστάται μόνο εφόσον η νόσος εκδηλώνεται σε χοιρίδια ηλικίας μέχρι μίας εβδομάδας. 4.10 **Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντιδόση)** Δεν είναι απαραίτητα. 4.11 **Χρόνος(οί) αναμονής** 30 ημέρες. 5. **ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ** Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Ανοσολογικά σκευάσματα για ζώα της οικογένειας Suidae, Χοίροι, εμβόλια αδρανοποιημένων βακτηρίων (μαζί με μικτολάσματα, τοξοειδή και γλαυιδια), εμβόλιο ακτινοβόλλου/ αμύφουλου. Κωδικός ATCvet: Q109AB07. 5.1 **Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες** Το PLEURO SUIVAX είναι αδρανοποιημένο εμβόλιο, προσροφημένο σε υδροξείδιο του αργιλίου, κατά της πλευροπνευμονίας του χοίρου που οφείλεται στον *Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae*. Η πλευροπνευμονία εμφανίζεται συνήθως κατά την περίοδο της αναπώσεως των χοίρων προκαλώντας θνησιμότητα και σημαντική μείωση των αποδόσεων των ζώων. Η σωστή χορήγηση του PLEURO SUIVAX επιτρέπει την εγκατάσταση ισχυρής ανοσίας σε όλη την παραγωγική περίοδο των παχυνόμενων χοίρων. Ο περιοδικός εμβολιασμός των χοιρομητέρων στις μονάδες αναπαραγωγής-πάχυνσης εξασφαλίζει τη μετάδοση υψηλού βαθμού ανοσίας στα χοιρίδια, προστατεύοντάς τα από τις πρώτες ήδη εβδομάδες της ζωής τους. Εγκλιβόσονται έτσι ένα βασικό επίπεδο ανοσίας στα ζώα, που μειώνει τη λοίμωξη πίσω στην οποία ασκούν οι συγκεκριμένοι μικροοργανισμοί του περιβάλλοντος της εκτροφής. 5.2 **Φαρμακοκινητικά στοιχεία** Δεν αναφέρονται. 6. **ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** 6.1 **Κατάλογος εκδόχων** Thiomersal 0,1 mg - Aluminium hydroxide 0,17 ml. 6.2 **Ασυμβατότητες** Δεν είναι γνωστές ασυμβατότητες με άλλα φάρμακα. 6.3 **Διάρκεια ζωής** 12 μήνες. 6.4 **Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος** Διατηρείται στο ψυγείο, σε θερμοκρασία +2° C έως +8° C. Να μη καταψύχεται. 6.5 **Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας** Υάλινης φιάλης Type I flint glass, με ελαστομερές πώμα σφραγισμένο με δακτύλιο αλουμινίου των 100 και 250 ml. 6.6 **Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν** Να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος από το περιεχόμενο, τους περιέκτες και τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος. 7. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ FATRO S.p.A.** - Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna), Italy. 8. **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** 5198/K-2561/10.5.93. 9. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ** Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 10. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ** 11. **ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΗΣ** Δεν ισχύει. 12. **ΧΟΡΗΓΗΣΗ** Χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή.



Φιαλίδιο 250 ml (100 δόσεις)



FATRO HELLAS S.P.A.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

FATRO HELLAS Μ.ΕΠΕ - 2ο χιλ/τρο ΠΑΙΑΝΙΑΣ-ΣΠΑΤΩΝ, 190 02, ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ: + 30 210 6644331 - FAX: +30 2106644334 - E-mail: fatro@fatro-hellas.gr