



ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ
ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ CUSHING
ΣΤΟ ΣΚΥΛΟ



FATRO HELLAS S.P.A.

ΟΤΑΝ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Ο υπερφλοιοεπινεφριδισμός (Νόσος και σύνδρομο του **Cushing**) αποτελεί ενδοκρινοπάθεια που διαγιγνώσκεται συχνά σε ηλικιωμένους σκύλους. Χαρακτηρίζεται από την εκδήλωση κλινικών συμπτωμάτων που οφείλονται στην έκθεση του οργανισμού σε υπερβολικά επίπεδα κορτιζόλης.




ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΙΤΙΟΥ:

Οι τύποι του
Υπερφλοιοεπινεφριδισμού
στο σκύλο

Ο υπερφλοιοεπινεφριδισμός, ή Νόσος του Cushing, αποτελεί ενδοκρινοπάθεια που διαγιγνώσκεται ολοένα και πιο συχνά σε ηλικιωμένους σκύλους.

Στο 90% των περιπτώσεων, η νόσος προκαλείται από την αυξημένη έκκριση της επινεφριδιοφλοιοτρόπου ορμόνης (ACTH) εξαιτίας μη φυσιολογικής λειτουργίας της υπόφυσης, που οδηγεί σε υπερπλασία των επινεφριδίων και υπερέκκριση γλυκοκορτικοστεροειδών.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, προέρχεται από νεοπλασίες στα επινεφρίδια (αδενώματα και καρκινώματα).



Ο υποφυσιακός τύπος,
εντοπίζεται γενικά σε
ζώα ηλικίας άνω
των 9 ετών.

**Ο επινεφριδικός
τύπος** διαγιγνώσκεται
σε ακόμα μεγαλύτερες
ηλικίες σε σχέση με τον
υποφυσιακό

ΤΡΙΛΟΣΤΑΝΗ: Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ CUSHING

Ο κύριος στόχος της θεραπείας του υπερφλοιοεπινεφριδισμού είναι η **ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΚΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ**

Η φαρμακευτική θεραπεία εκλογής βασίζεται στη χρήση δραστικών συστατικών που αναστέλλουν την στεροειδογένεση, όπως η **Τριλοστάνη**.

Η τριλοστάνη είναι στεροειδές που **δρα ως αναστολέας** του ενζύμου 3-β-υδρόξυ-στεροείδο-ισομεράσης, οδηγώντας έτσι σε μείωση της στεροειδογένεσης στα επινεφρίδια.

Η τριλοστάνη δεν ασκεί καμία άμεση επίδραση στο κεντρικό νευρικό ή το καρδιαγγειακό σύστημα.

Η τριλοστάνη αποτελεί την καθιερωμένη θεραπευτική επιλογή για τον υπερφλοιοεπινεφριδισμό στους σκύλους, και έχει αποδειχθεί ότι παρέχει αξιόπιστο έλεγχο των συμπτωμάτων στον υποφυσιακό και τον επινεφριδικό τύπο της νόσου.



ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ **ΤΡΙΛΟΣΤΑΝΗΣ**



Υψηλή δραστικότητα μέσω της αναστρέψιμης αναστολής της παραγωγής κορτιζόλης
(δεν είναι κυτταροτοξική).



Αποτελεσματική δράση σε χαμηλές δόσεις,
περιορίζοντας την εκδήλωση ανεπιθύμητων ενεργειών.



Ταχεία μείωση της κορτιζόλης στο πλάσμα του αίματος (μεταξύ 2 και 6 ωρών μετά τη χορήγηση).



Ταχεία απορρόφηση από τον πεπτικό σωλήνα,
ιδίως όταν χορηγείται μαζί με την τροφή.



Άριστη φαρμακοκινητική που επιφέρει βελτίωση της κλινικής εικόνας εντός ολίγων ημερών από την πρώτη χορήγηση.

Για μία **πολύπλοκη νόσο**, είναι
απαραίτητη μία **απλή θεραπεία**



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ CUSHING:

ΑΚΡΙΒΗΣ και ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΟΣΗΣ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ



βέλτιστος έλεγχος της ανασταλτικής δράσης της τριλοστάνης

ΕΧΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΓΕΥΣΗ
(ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΟΡΒΙΤΟΛΗ)



διασφαλίζει την πλήρη κατάποση

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ 2 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ και 3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



προσαρμογή της σωστής δόσης σε σκύλους κάθε μεγέθους



ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Κάθε συσκευασία περιέχει **2 βαθμονομημένες σύριγγες** του **1 ml** και των **5 ml** για χορήγηση ακριβώς της σωστής δόσης.
Το **Trilocur®** θα πρέπει να χορηγείται μία φορά ημερησίως κατά τη σίτιση.
Μετά από την έναρξη της αγωγής, προτείνεται να γίνεται προσαρμογή της δόσης με βάση την κλινική απόκριση του κάθε σκύλου σε αυτή.

Επιλογή του κατάλληλου Trilocur® με βάση την αποτελεσματική δοσολογία (mg/kg)



Δοσολογία έως και 2 mg/kg



Trilocur® 10 mg
Φιάλη 90 ml

ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΟΣΗΣ

$$\text{Όγκος (ml)} = \frac{\text{Ημερήσια δοσολογία} \left(\frac{\text{mg}}{\text{kg}} \right) \times \text{σωματικό βάρος (kg)}}{10 \left(\frac{\text{mg}}{\text{ml}} \right)}$$



Οποιαδήποτε δοσολογία



Trilocur® 50 mg
Φιάλη 25 ml

Trilocur® 50 mg
Φιάλη 50 ml

ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΟΣΗΣ

$$\text{Όγκος (ml)} = \frac{\text{Ημερήσια δοσολογία} \left(\frac{\text{mg}}{\text{kg}} \right) \times \text{σωματικό βάρος (kg)}}{50 \left(\frac{\text{mg}}{\text{ml}} \right)}$$

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

- Η προτεινόμενη αρχική δοσολογία είναι περίπου 2 mg Τριλοσπάνη/kg/ημέρα
- Η προσαρμογή της δοσολογίας γίνεται με βάση την απόκριση του κάθε σκύλου ξεχωριστά

ΧΟΡΗΓΗΣΗ

- Μία φορά ημερησίως, από το στόμα, κατά τη σίτιση
- Απευθείας στο στόμα του σκύλου
- 2 βαθμονομημένες σύριγγες με διαβάθμιση ανά 0,01 ml και 0,1 ml

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

- Μετά από 10 ημέρες, στη συνέχεια σε 4 και 12 εβδομάδες, και έπειτα ανά 3 μήνες

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ

- Το **Trilocur®** είναι αποδεδειγμένα βιοϊσοδύναμο με το προϊόν αναφοράς: **συνεπώς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενή ζώα που ήδη λαμβάνουν αγωγή**

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Το **Trilocur®** 10 mg/ml δεν πρέπει να χορηγείται όταν η δοσολογία είναι μεγαλύτερη των 2 mg τριλοσπάνης ανά kg σωματικού βάρους
- Για τη διαχείριση ασθενών σκύλων με δοσολογία μεγαλύτερη από 2 mg/kg σ.β., συνιστάται η χορήγηση του **Trilocur®** 50 mg/ml.



Trilocur®
50 mg/ml

médicaments corticostéroïdes
antibiotiques à large spectre

INDICATIONS
Inflammation des yeux
Infection des yeux
Inflammation de la conjonctive
Infection de la conjonctive
Inflammation de la cornée
Infection de la cornée
Inflammation de l'iris
Infection de l'iris
Inflammation du corps vitré
Infection du corps vitré
Inflammation de la rétine
Infection de la rétine
Inflammation de la choroïde
Infection de la choroïde
Inflammation de la sclère
Infection de la sclère
Inflammation de la pupille
Infection de la pupille
Inflammation de la chambre antérieure
Infection de la chambre antérieure
Inflammation de la chambre postérieure
Infection de la chambre postérieure

25 ml



Trilocur®
50 mg/ml

necpno cizivajipigru
zavlešiva došitna

EU/2/04/12/006

Zilipigru ipe zivajipigru
ešiv ipe zavlešiva došitna
1 ml ešiv ipe 5 ml
Zilipigru ipe zavlešiva
došitna 1 ml i 5 ml

50 ml



Trilocur
10 mg/ml
suspensja doustna
zawiesina doustna
90 ml

10 mg/ml
dostawa ewidencyjny
zawiesina doustna
EU/2/24/513.002

Ziemia przy przebiegu
ani i nowa stryżnica 100
1 ml i w 5 ml
Stryżnica doustna
1 ml i 5 ml

90 ml

Trilocur® 10 mg
Φιάλη 90 ml

Κάθε συσκευασία περιέχει 2 βαθμονομημένες σύριγγες, του 1 ml και των 5 ml, για χορήγηση ακριβώς της απαραίτητης δόσης.

[illegible]