

Η ΡΙΦΑΞΙΜΙΝΗ ΕΧΕΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ:

Μοναδικό και αυθεντικό αντιβιοτικό για
κτηνιατρική χρήση

Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II των MRL
ουσιών του EMEA (ασφαλή φάρμακα)

Πολύ δραστική έναντι των βακτηρίων που
προσβάλλουν τον μαστό και την μήτρα

Πλήρες και ευρύ φάσμα δράσης (Gram θετικά
και Gram αρνητικά βακτήρια, καθώς και
αναερόβια)

Πολύ χαμηλή MIC κατά των *Staph. aureus* και
Arcanobacterium pyogenes

100% τοπικά δραστική, καθώς πρακτικά δεν
μεταβολίζεται

Δεν διαπερνά τους οργανικούς φραγμούς

Μηδενικός χρόνος αναμονής για το κρέας και
το γάλα

Ειδικά διαμορφωμένη για ενδομαστική και
ενδομήτρια χρήση


Τρία διαφορετικά σκευάσματα υψηλής και
ταχείας διάχυσης

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΞΗΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

FATROXIMIN
100 mg/5 ml
σύριγγα, ενδομαστική αλοιφή για αγελάδες

- Ταχεία και πλήρης
απελευθέρωση του
δραστικού συστατικού.
- Ομοιόμορφη κατανομή
στον μαστό με την
μέγιστη
θεραπευτική
δράση.
- Υψηλού βαθμού ανοχή από τον μαστό.
- Διαρκής σταθερότητα και ιξώδες σε διαφορετικές
θερμοκρασίες.
- Η παρουσία της Ριφαξιμίνης διασφαλίζεται για
ολόκληρη την ξηρά περίοδο με ταχεία απέκκριση
κατά την έναρξη της γαλακτοπαραγωγής.
- 100% τοπικά δραστικό αντιβιοτικό με σαφή
δράση που περιορίζει την πίεση επιλογής για την
ανάπτυξη εκτεταμένης μικροβιακής αντοχής.
- Απουσία καταλοίπων σε άλλους ιστούς και όργανα.
- Κατοχυρωμένο σύστημα Twininsert.


Χορήγηση αγωγής σε γαλακτοπαραγωγές αγελάδες κατά την ξηρά
περίοδο, το γάλα των οποίων ήταν μικροβιολογικά θετικό
(*Streptococcus* spp. και *Staphylococcus* spp.)



FATROXIMIN ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑΙΟΣ ΑΦΡΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΤΙΔΑΣ

FATROXIMIN
0,75 g/100 g
ενδομητρίαφος αφρός για αγελάδες και φορβάδες
που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

- Υψηλό ποσοστό
κλινικής
αποδομής και
βελτίωσης των
αναπαραγωγικών
δεικτών.
- Υψηλή και μακράς διάρκειας ενδομήτρια
δραστικότητα χωρίς χρόνους αναμονής.
- Αντιμικροβιακό σπρέυ εφάπαξ ενδομήτριας
χορήγησης.
- Ταχεία διόγκωση του παραγόμενου αφρού.
- Εκτείνεται σε όλο το ενδομήτριο, σε κάθε περιοχή
της μήτρας, καθώς και το ραχιαίο τοίχωμα,
τα άκρα των κεράτων, τις κοιλότητες και τις
πτυχώσεις της μήτρας.
- Η ριφαξιμίνη επιτυγχάνει συγκεντρώσεις αρκετές
φορές υψηλότερες από τις MICs των κοινών
παθογόνων της μήτρας, με ευρύ φάσμα δράσης
κατά των Gram+ και Gram-, καθώς και των
Αερόβιων και Αναερόβιων.



Η μήτρα μετά την χορήγηση του **FATROXIMIN**
ενδομητρίαφου αφρού: παρατηρήστε τον αυξημένο όγκο
της μήτρας, καθώς και την διάταση των πτυχώσεων του
τοιχώματός της.

FATROXIMIN ΠΕΣΣΟΙ ΜΗΤΡΑΣ
ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΧΕΙΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ

FATROXIMIN
300 mg/4 g
πessός, για αγελάδες, βουβάλες και φορβάδες
που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

- Ο αναβρασμός και η δημιουργία
αφρού, που προκαλείται από τον
φορέα, επιτρέπει την ταχεία
απελευθέρωση του αντιβιοτικού και
την πλήρη και ομοιόμορφη κατανομή
στο επιθήλιο της μήτρας και του κόλπου.
- Ευρέος φάσματος
βακτηριοκτόνος δράση
έναντι των μικροοργανισμών
που εμπλέκονται πιο συχνά στην
παθολογία της γεννητικής οδού μετά
τον τοκετό και ιδιαίτερα στην ενδομητρίτιδα.
- Δεν απορροφάται δια μέσου του τοιχώματος της
μήτρας.
- Δεν αφήνει κατάλοιπα στο γάλα και δεν υπάρχει
χρόνος αναμονής για το κρέας.
- Η συσκευασία σε blister επιτρέπει την χρήση
ενός πессού διατηρώντας τους υπόλοιπους
αποστειρωμένους και ασφαλείς.

