



ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σωματικό βάρος του σκύλου (kg)	Όγκος δόσης (ml)
1	0,05
5	0,25
10	0,50
15	0,75
20	1,00
25	1,25
30	1,50
35	1,75
40	2,00
45	2,25
50	2,50
55	2,75
60	3,00
65	3,25

Σωματικό βάρος σκύλου (kg)	Όγκος δόσης (mL)	Σωματικό βάρος σκύλου (kg)	Όγκος δόσης (mL)
1	0,05	35	1,75
5	0,25	40	2,00
10	0,50	45	2,25
15	0,75	50	2,50
20	1,00	55	2,75
25	1,25	60	3,00
30	1,50	65	3,25

154/E/f - 02/20 FOR VETERINARIANS


σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα για σκύλους
μοξιδεκτίνη

Είναι μέσα στην καρδιά σας...


Το **Aflaria® SR** τα προστατεύει



FATRO HELLAS Μ.ΕΠΕ - 2ο χιλ/τρο ΠΑΙΑΝΙΑΣ-ΣΠΑΤΩΝ, 190 02, ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ: + 30 210 6644331 - FAX: +30 2106644334 - www.fatro-hellas.gr - E-mail: fatro@fatro-hellas.gr



Afilaria® SR



Το **Afilaria® SR** είναι ενέσιμο εναιώρημα με βάση τη μοξιδεκτίνη, ένα ημισυνθετικό παράγωγο της νημαδεκτίνης που ανήκει στην οικογένεια των μιλιπεμυκινών.

Ο μηχανισμός δράσης του **Afilaria® SR** συνίσταται στην εκλεκτική σύνδεση με τους διαύλους ιόντων χλωρίου των νευρικών κυττάρων των ασπόνδυλων. Οι επακόλουθες μεταβολές στην διαπερατότητα της μεμβράνης επάγουν την παράλυση και το θάνατο του παρασίτου.

Η μοξιδεκτίνη, ακόμα και σε ενέσιμη μορφή, έχει ευρύ φάσμα ασφάλειας για τις φυλές σκύλων με μετάλλαξη στο γονίδιο MDR1.

Η πρωτότυπη τεχνολογία μικροσφαιριδίων του **Afilaria® SR**

Στο ενέσιμο εναιώρημα του **Afilaria® SR**, η μοξιδεκτίνη περιέχεται σε **μικροσφαιρίδια από λιπίδια** φυσικής προέλευσης που επιτρέπουν την εξαιρετική αποθήκευση της δραστικής ουσίας.

Το περίβλημα χοληστερόλης επιτρέπει την σταθερή και ομοιογενή αποδέσμευση μοξιδεκτίνης και την υψηλή της ανεκτικότητα¹.

Η δραστική ουσία κατανέμεται ομοιόμορφα εντός των μικροσφαιριδίων. Η τεχνολογία παραγωγής της μοξιδεκτίνης, η ειδική φαρμακοτεχνική μορφή της και η εξαιρετική συγγένειά της με το λιπώδη ιστό, επιτρέπουν την σταδιακή και παρατεταμένη αποδέσμευση για ολόκληρη την περίοδο κινδύνου μόλυνσης με διροφιλάρια.

Οι μελέτες που διεξήχθησαν για την έγκριση του **Afilaria® SR** αποδεικνύουν ότι η αγωγή με το προϊόν γίνεται καλά ανεκτή από τον οργανισμό του σκύλου από τη στιγμή της χορήγησής της.

Μετά από τη χορήγηση, η λιπόφιλη Μοξιδεκτίνη κατανέμεται αργά και σταδιακά από τα μικροσφαιρίδια προς τους ιστούς. Η δραστική ουσία απελευθερώνεται σε συγκέντρωση επαρκή για να εγγυηθεί τον έλεγχο της ανάπτυξης προνυμφών (L₃ και L₄) της *Dirofilaria immitis* για ολόκληρη την περίοδο κινδύνου μόλυνσης, καθώς και για τον έλεγχο της *Dirofilaria repens* και τα προνυμφικά και ενήλικα στάδια των *Ancylostoma caninum* και *Uncinaria stenocephala*.

Patent ITUB20153652

η μέθοδος ανασύστασης του **Afilaria® SR**

Για την εύκολη και αποτελεσματική ανασύσταση του **Afilaria® SR** μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο εύχρηστος προσαρμογέας που περιέχεται στη συσκευασία. Χάρη στο ερμητικό του σφράγισμα, το οποίο διατηρεί το προϊόν αποστειρωμένο², ο προσαρμογέας επιτρέπει πολλαπλές αναρροφήσεις του εναιωρήματος με μεγάλη ευκολία.



Δείτε το βίντεο "Οδηγίες Ανασύστασης" μέσω του συνδέσμου.



εύκολη αποθήκευση του **Afilaria® SR**

Μετά από το πρώτο άνοιγμα και την πρώτη χρήση, το φιαλίδιο με το εναιώρημα μπορεί να αποθηκευτεί στη συσκευασία **Afilaria® SR**, η οποία το προστατεύει και διευκολύνει τη χρήση του.



Η σύριγγα με βιδωτό άκρο απλοποιεί την μεταφορά του διαλύτη για την ετοιμασία του εναιωρήματος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- 1) Τεχνική ανάλυση στο φάκελο έγκρισης του προϊόντος
- 2) Τεχνική ανάλυση στο φάκελο έγκρισης του προϊόντος