

ΜΑΣΩΜΕΝΟ

ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

**ΠΟΛΥ
ΕΥΓΕΥΣΤΟ**

χρονικό διάστημα

ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ

Χαρούμενες καρδιές χτυπούν για περιπέτειες

Fatrobendan® 10 mg - 100 μασώμενα δισκία για σκύλους

[illegible]

αναπόσπαστη διαδικασία, για τη διαδραμάτιση της απορρόφησης, το σκευασμένο βάρος πρέπει να προσομοιώνει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια το σκελετικό σκελετό. Οτιδήποτε βάρος πρέπει να προσομοιώνει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια το σκελετικό σκελετό, ονομάζεται σκελετικό σκευασμένο βάρος. Τα σκελετικά σκευασμένα βάρη είναι διαθέσιμα σε 0,2 mg έως 6 mg (6 mg σκελετικό σκευασμένο βάρος είναι η μέγιστη δοσολογία που μπορεί να χορηγηθεί σε ασθενείς με οστεοπόρωση) και σε 0,2 mg έως 0,5 mg (0,5 mg σκελετικό σκευασμένο βάρος είναι η μέγιστη δοσολογία που μπορεί να χορηγηθεί σε ασθενείς με οστεομυελία). Τα σκελετικά σκευασμένα βάρη είναι διαθέσιμα σε 0,2 mg έως 0,5 mg (0,5 mg σκελετικό σκευασμένο βάρος είναι η μέγιστη δοσολογία που μπορεί να χορηγηθεί σε ασθενείς με οστεομυελία) και σε 0,2 mg έως 0,5 mg (0,5 mg σκελετικό σκευασμένο βάρος είναι η μέγιστη δοσολογία που μπορεί να χορηγηθεί σε ασθενείς με οστεοπόρωση).

Βάρος τριού (kg)	Διακία Fatrobandan 1,25 mg	Διακία Fatrobandan 5 mg	Διακία Fatrobandan 10 mg
1	¼		
2	½		
4	¾		
5	1	¼	
10	2	½	¼
15		¾	
20		1	½
25		1 + ¼	
30		1 + ½	¾
35		1 + ¾	
40		2	1
50			1 + ¼
60			1 + ½

1. Atkins, C., Bonagura, J., Ettinger, S., Fox, P., Gordon, S., Haggstrom, J., Hamlin, R., Keene, B., Luis-Fuentes, V. and Stepien, R., 2009. Guidelines for the diagnosis and treatment of canine chronic valvular heart disease. *Journal of veterinary internal medicine*, 23(6), pp.1142-1150.

2. Keene, B.W., Atkins, C.E., Bonagura, J.D., Fox, P.R., Häggström, J., Fuentes, V.L., Oyama, M.A., Rush, J.E., Stepien, R. and Uechi, M., 2019. ACVIM consensus guidelines for the diagnosis and treatment of myxomatous mitral valve disease in dogs. *Journal of veterinary internal medicine*, pp.1127-1140.



FATRO HELLAS Μ.ΕΠΕ - 2ο χιλ/τρο ΠΑΙΑΝΙΑΣ-ΣΠΑΤΩΝ, 190 02, ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ: + 30 210 6644331 - FAX: +30 2106644334 - www.fatro-hellas.gr - E-mail: fatro@fatro-hellas.gr

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ

FOR VETERINARIANS

F034/E/e



Fatrobendan

PIMOBENDAN

PIMOBENDAN

Χαρούμενες καρδιές χτυπούν για περιπέτειες

**FATRO HELLAS S.P.A.**


ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΑΡΞΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:
ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΕΙ ΤΗΝ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ



Το **Fatrobendan®** ενδείκνυται για την διαχείριση της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας σε σκύλους, που προκαλείται από διατατική μυοκαρδιοπάθεια ή χρόνια βαλβιδοπάθεια (παλινδρόμηση μιτροειδούς και/ή τριγλώχινης βαλβίδας).

ΠΙΜΟΒΕΝΔΑΝΗ, Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ACVIM ⁽¹⁾ ⁽²⁾




Σκύλοι υψηλού ρίσκου για ανάπτυξη καρδιακής ανεπάρκειας αλλά χωρίς ανιχνεύσιμες ανατομικές αλλοιώσεις (π.χ. Cavalier King Charles Spaniel)



Ασυμπτωματικοί σκύλοι χωρίς ακτινολογικά ή υπερηχολογικά ευρήματα λόγω ανατομικών αλλοιώσεων ως αποτέλεσμα βαλβιδοπάθειας



Ασυμπτωματικοί σκύλοι με αλλοιώσεις μυοκαρδιοπάθειας, με παλινδρόμηση βαλβίδας (αιμοδυναμικά ισχυρή), με ακτινολογικά ή υπερηχολογικά ευρήματα αριστερής καρδιακής ανεπάρκειας



Σκύλοι με κλινικά συμπτώματα συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας που σχετίζονται με ανατομικές αλλοιώσεις (τώρα ή στο παρελθόν)



Σκύλοι με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που δεν ανταποκρίνεται στην θεραπεία

Χαρούμενες καρδιές
χτυπούν για περιπέτειες

Η ΠΙΜΟΒΕΝΔΑΝΗ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΔΙΠΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ

**ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΥΣΠΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ**
μέσω ευαισθητοποίησης στο ασβέστιο

**ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΛΕΠΤΟ ΟΓΚΟΣ
ΑΙΜΑΤΟΣ (ΚΛΟΑ)**

**ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ**

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΑΓΓΕΙΑ

**ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΦΛΕΒΩΝ
ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΩΝ**
μέσω αναστολής της
φωσφοδιεστεράσης III

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Το **Fatrobendan®** πρέπει να χορηγείται από το στόμα σε δοσολογία 0,2-0,6 mg πιμοβενδάνης/kg σωματικού βάρους ανά ημέρα.

Η προτεινόμενη δοσολογία είναι 0,5 mg/kg σ.β. σε δύο χορηγήσεις ημερησίως (0,25 mg/kg κάθε φορά): μία δόση το πρωί και μία δόση ύστερα από 12 ώρες.

Κάθε δόση πρέπει να χορηγείται περίπου 1 ώρα πριν από την χορήγηση τροφής.

Σωματικό βάρος	FATROBENDAN 1,25 mg	FATROBENDAN 5 mg	FATROBENDAN 10 mg
1			
2			
4			
5			
10			
15			
20			
25			
30			
35			
40			
50			
60			

Ο πίνακας δείχνει την ποσότητα του **Fatrobendan®** σε κάθε χορήγηση, που αντιστοιχεί περίπου σε 0,25 mg πιμοβενδάνης/kg σ.β.